


GutLife® Creme

Abhilfe bei gereizter Analschleimhaut während und nach einer Strahlentherapie



Eine Schleimhautentzündung im Analbereich kann bei den Patienten zu Juckreiz, Rötung, Schwellung und Schmerzen führen. Auslöser für diese Entzündung kann eine Strahlentherapie sowie chemischer und thermischer Stress sein.

Durch eine Strahlentherapie werden die in der Haut und Schleimhaut befindliche Mastzellen aktiviert, die eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr spielen. Auf den massiven Angriff einer Bestrahlung antworten diese mit einer Überreaktion, wodurch ein entzündlicher Prozess ausgelöst wird.

Die in der GutLife® Creme enthaltene Wirkstoffkombination von F.A.G.® (Fatty Acids Group), beeinflusst die Mastzellaktivität und damit die Ausschüttung von körpereigenen Substanzen die Haut und Schleimhäute vor allem in der Chemo- und Strahlentherapie negativ beeinflussen. Es wirkt auch auf die Cannabinoidrezeptoren.

GutLife® Creme kann die unerwünschten Nebenwirkungen an Haut und Schleimhaut minimieren und so einen Beitrag zum Erfolg der Therapie leisten.



GutLife® Creme ist rezeptfrei
in Ihrer Apotheke erhältlich.

GutLife® Creme, 30 ml
PZN 16082282

SWISS MEDICAL FOOD

Ihr Partner in der Supportiv-Therapie

GutLife® Creme können Sie direkt in unserem eShop bestellen:

shop.swissmedicalfood.com



Vertrieb
Deutschland

0561 - 47555977

Swiss Medical Food DE GmbH

Falderbaumstrasse 16a | 34123 Kassel



Was ist Pruritus Ani?

Als Pruritus Ani (dt. Juckreiz des Afters) bezeichnet man in der Medizin einen dermatologischen Zustand, der durch einen chronischen, unangenehmen Juckreiz oder ein brennendes Gefühl im Analbereich gekennzeichnet ist.

Tipps

- Vermeiden Sie feuchte Toilettentücher wegen allergischer Reaktionen auf chemische Zusatzstoffe in den Tüchern.
- Tragen Sie Baumwollunterwäsche (keine synthetische Wäsche), damit es nicht zu warm und feucht im Intimbereich wird.
- Vermeiden Sie mechanische Reize: keine einschneidende Kleidung, keine zu engen Hosen und Slips, weiches Toilettenpapier mit Vorsicht anwenden.
- Meiden Sie zu scharfes Essen, Salziges, Nüsse, Schokolade, Milchprodukte oder Zitrusfrüchte sowie koffein- und alkoholhaltige Getränke.

Anwendung von GutLife® Creme

Während der Strahlentherapie die Creme nach der Exposition auftragen, bis sie vollständig eingezogen ist. Die Behandlung alle 6 Stunden oder nach Ermessen des Arztes oder Apothekers wiederholen.

Für andere Anwendungen 2- oder 3-mal am Tag auf die betroffene Stelle sanft auftragen und sowohl den Anus als auch dessen unmittelbaren inneren Bereich sanft einmassieren, bis die Creme vollständig eingezogen ist. Die Behandlung bis zum Verschwinden der Symptome fortsetzen.

Die Informationen auf dieser Karte ersetzen nicht die Beratung durch Ihren Arzt oder Apotheker. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Produktes aufmerksam durch, denn sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung beachten sollen.

